



Implantación nuevo protocolo VPH de autotoma

Assir Ramona Via. El Prat.



M Eugenia Calvo
Dalia Mañá
Angeles Pizarro


Introducción



- El cáncer de cuello uterino es la cuarta neoplasia más frecuente en todo el mundo
- El VPH es el agente causal de los CA de cérvix así como de sus lesiones precursoras y de algunos CA como anal, vulvar, vaginal, pene y orofaríngeo.
- Las mujeres mayores de 30 años poseen menos probabilidad de infección pero un mayor porcentaje de infecciones persistentes
- Alrededor de un 80% de hombres y mujeres se pondrán en contacto con el virus a lo largo de su vida, no obstante, el 90% de las infecciones serán transitorias
- Su mayor valor predictivo negativo, nos permite aumentar el intervalo entre cribados de hasta cinco años.

A quien va dirigido el programa?


Mujeres de entre 30 y 65 años



Las mujeres citadas en consulta que no deseen prueba de autotoma, se les ofrece prueba de VPH en consulta (“prueba piloto reflex”), y se les explica prueba de autotoma para la siguiente revisión .

Posibles motivos de rechazo a la autotoma


- Miedo a hacerse daño
- Reticencia a la manipulación de los genitales
- Miedo a la mala manipulación de las muestras
- Miedo a que la autotoma no tenga la misma validez que las pruebas realizadas por un profesional



La barrera idiomática será criterio para la prueba en consulta.

Criterios de exclusión

- Edad fuera de protocolo
- Durante la gestación
- Primeros 3 meses postparto
- Menstruación
- Seguimiento de patología



Metodología del cribado:




1. Las mujeres de entre 30 y 65 años pueden programarse directamente en mostrador del Assir o vía telefónica
2. Se les explica que recibirán un SMS en 7-10d con un enlace explicativo de la prueba
3. Pueden dirigirse a una de las farmacias indicadas en el enlace para entrega del escobillón (tienen que enseñar el SMS)
4. Se realizan la prueba en casa y la devuelven a la misma farmacia (tienen 7 días para entregarlo a Tª ambiente)
5. En 15 días reciben SMS con resultado de la prueba y lo pueden ver también en la Meva Salut
6. Si la prueba es negativa, ya se les informa previamente que el siguiente control será a los 5 años. Si es positiva, reciben llamada del Assir

Gestión pruebas VPH positivas



- Se crea “Agenda ICO”
- Revisión de los resultados de VPH positivos. por parte de las llevadoras :
 - SI VPH 18 → pasamos a gine para derivación colposcopia hospitalaria
 - Si VPH 16 u otros → llamamos a la usuaria para programar citologia

Gestión resultados citologías por VPH +



- Si la citología negativa VPH (no 16-18) Llamamos a la usuaria pra cotest al año
 VPH 16 Pasamos a gine para derivación colpo en Assir

- Si la citología es patológica: programamos con gine en 9E para revisión y seguimiento

Gestión cotest al año



Revisión Hª clínica de la causa de solicitud cotest

En caso de cotest negativo en ambas pruebas

- Si AP de VPH no 16-18. Llamamos a la usuària para informar y se indica cotest al año de nuevo antes de pasar a protocolo de 5 años.
- En cualquiera otro caso, programamos en 9E con gine para valoración y seguimiento.

En caso de cotest positivo en cualquiera de las dos pruebas

Programamos en 9E con gine para valoración y seguimiento.

Actuación de la llevadoras




Información:

-sobre el nuevo protocolo de VPH por autotoma aprovechando cualquier concepto de visita en consulta

-información sobre el circuito a seguir para acceder al programa

-información en cuanto a la técnica de recogida utilizando los escobillones y hojas informativas que disponemos en consulta




Gestión de resultados : contacto telefónico con la usuaria para informar del resultado VPH+ y posterior seguimiento.



Dificultades con las que nos hemos encontrado y propuestas

- Falta de información previa a las usuarias y también a los profesionales de la salud
Propuesta : charlas informativas a los profesionales de la salud en los caps de la zona
charlas informativas a la población en colaboración con los ayuntamientos
- Las usuarias programadas para cotest al año se olvidan en un % muy elevado
Propuesta : envío de cartes o SMS de recordatorio al año
- Las mujeres de entre 61 y 65 años con mal cribaje anterior, según protocolo se hace VPH y cotest a los 5 años- Riesgo de pérdida
Propuesta: que a estas mujeres se les haga en consulta la prueba de VPH y se les recuerde cotest en 5 años en consulta.

Conclusión



- El protocolo de VPH de autotoma o realizado en consulta, ha reducido considerablemente el tiempo de gestión de los resultados y el seguimiento de la patología cervical.
- Tiempos de resultados
 - SMS recibido a los 7-10d
 - Resultado VPH de autotoma en dos semanas
 - Resultados VPH pp reflex en 7-10d
 - Gestión de la agenda ICO al día
 - Resultados LAC por VPH + en dos semanas
 - Colposcopias según protocolo

